

Biodiversité des prairies permanentes : Une méthode simple de diagnostic (1Cédérom) PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Cet ouvrage présente une méthode simple de diagnostic de la biodiversité de la faune et de la flore d'une prairie permanente à partir de notations prises sur le terrain, sans reconnaissance précise d'espèces. Il se compose d'un manuel et d'un CD-ROM (PC).

- Le manuel détaille la mise en oeuvre de la méthode accompagnée des documents nécessaires à la réalisation du diagnostic : fiches terrain, fiches d'aides à l'observation rassemblées dans un carnet couleur, grilles de résultats. Il présente au préalable les choix fondamentaux effectués en termes de biodiversité et d'approche scientifique pour élaborer cette méthode. Il propose aussi une démarche pour une adaptation régionale de ce diagnostic, initialement destiné aux prairies d'Auvergne.

Des pistes d'interprétation des résultats sont développées et permettent d'aborder les déterminants de la biodiversité des prairies. Enfin, des exemples d'application en situation pédagogique et professionnelle illustrent des utilisations possibles de cet outil dans l'enseignement ou le développement agricole.

- Le CD-ROM propose diverses ressources pour présenter et utiliser la méthode. Une vingtaine d'exercices interactifs permettent notamment de mieux s'approprier l'outil, de réfléchir à

l'interprétation des diagnostics et d'enrichir ses connaissances sur la biodiversité des prairies. Constitué à la fois d'un guide technique, d'apports plus théoriques et d'exercices d'application, cet ouvrage permet d'aborder de façon concrète la biodiversité et son évaluation et d'engager une réflexion sur sa gestion.

Public

Cet ouvrage s'adresse aux enseignants et formateurs à la recherche d'applications pratiques sur la biodiversité, ainsi qu'aux chargés de mission et techniciens de l'environnement et de l'agriculture souhaitant réaliser des diagnostics simplifiés de la biodiversité des prairies.

Les auteures

Dominique Orth : Maître de conférences en agronomie-écologie à VetAgro Sup (campus agronomique de Clermont-Ferrand). Ingénieure agronome, titulaire d'un doctorat en agro-écologie (INA Paris-Grignon), Dominique Orth est en charge de l'enseignement sur les prairies, depuis le fonctionnement de l'écosystème prairial jusqu'à sa gestion agricole et pastorale.

Claire Balay : Ingénieure d'études en agronomie-écologie à VetAgro Sup (campus agronomique de Clermont-Ferrand).

Les deux auteures développent leurs travaux de recherche sur la biodiversité des prairies au sein de l'UMR Métafort (AgroParisTech-Cemagref-Inra-VetAgroSup Clermont-Ferrand)

l'agriculture en faveur de la biodiversité (Natura 2000, Trame Verte et Bleue...) Productions ...
Une méthode d'évaluation du potentiel de . la part de prairies permanentes (35%), les .. Cela
reste simple : une fauche des berges en septembre, la pose d'une clôture ... région. Ce
spécialiste réalise le diagnostic du territoire.

1 oct. 2014 . Sur les 6,6 millions d'hectares de prairies permanentes en France, . Chaque jury
local utilise la méthode de notation commune à tous les territoires, afin . prairies fleuries grâce
à leur biodiversité et le rôle qu'elles jouent dans le système . En recto-verso, elle permet un
affichage simple du concours. Un.

POURQUOI ÉLABORER UNE MÉTHODE DE DIAGNOSTIC ... conserver la biodiversité
tant animale que végétale, moteur du fonctionnement ... tion agricole » est en interaction
permanente avec le milieu .. La simple analyse des pratiques agricoles n'est pas . la STH

(prairies naturelles, prairies semées depuis. 6 ans).

Application de la méthode de diagnostic « biodiversité ». 14 .. Pour les bois et les prairies humides les consignes d'entretien sont identiques que celles.

13 oct. 2016 . Biodiversité des prairies permanentes : une méthode simple de . pour la réalisation de diagnostic de la biodiversité de prairies permanentes.

français de son époque par la méthode, en utilisant l'outil des mathématiques, .. Biodiversité des prairies permanentes : une méthode simple de diagnostic.

Noté 0.0/5. Retrouvez Biodiversité des prairies permanentes : Une méthode simple de diagnostic (1Cédérom) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.

prairie ainsi que sur les risques de lessivage de l'azote après retournement en fonction de la succession . Afin de mesurer l'effet du retournement, deux méthodes ont été mises en œuvre en parallèle : . fallow soil using a simple dynamic model. Eur. .. Prairie permanente à très fort chargement animal (proche stabulation).

dans les zones de biodiversité (option 1) identifiées dans le zonage du territoire (voir .

OBJECTIFS DU PROGRAMME – détaillant la méthode de diagnostic.

Et décidément, les prairies dont on nous parle ne sont pas un simple gazon (Pélegrin, 2008). ..

Notre méthodologie associe une approche par entretiens avec les agriculteurs à . Les prairies de montagne : entre élevage et biodiversité. En montagne, les prairies permanentes et les pelouses d'alpage, tout en constituant.

Activités de pâturage, paysages et Biodiversité. . Évaluation d'outils de gestion de prairie. . In: Diagnostic procedures for crop N management, 22-23 novembre 1995, Colloques de .

Fonctionnement et dynamique des prairies permanentes.

KEY-WORDS : Aluminium, basic calcic fertilizer, change in time, cocksfoot, economic aspect, . La réponse au chaulage et à la fertilisation d'une prairie permanente suivie d'une prairie . tion de la biodiversité (PLANTUREUX et al., 2005). Le .. en 2004 en utilisant la méthode de DAGET et POISSONET ... Diagnosis of.

2 sept. 2012 . diagnostic de la biodiversité des prairies. Dominique Orth . comment cette méthode a été élaborée, et son . Diagnostic de biodiversité des pâtures de M. X et comparaison à la moyenne des . Orth D., Balay C., 2010, Biodiversité des prairies permanentes. Une méthode simple de diagnostic. Educagri.

6520 // Prairies de fauche de montagne. Natura2000. Formulaire de recherche. Rechercher.

Accueil > Prairies de fauche de montagne Pyrénéenne.

. développement d'espèces colonisatrices. — (Dominique Orth, Claire Balay, Biodiversité des prairies permanentes: Une méthode simple de diagnostic, 2010).

Fonctionnement de la prairie pâturée: structure du couvert et biodiversité, Fourrages, 166 : 165-188. . Les prairies permanentes de milieu océanique et de montagne humide. Outil de diagnostic agro-écologique et guide pour leur utilisation.

Cet ouvrage présente une méthode simple de diagnostic de la biodiversité de la faune et de la flore d'une prairie permanente à partir de notations prises sur le.

9 juin 2017 . alsacien désignant des prairies inondables avec des . biodiversité » et en lien avec le thème 2017 « Aménager, rénover et bâtir en faveur de la .. méthode d'identification des éléments de la TVB est une grille d'analyse simple du paysage à partir de . 2009, la ville a engagé un diagnostic écologique2 du.

SAGE de la Vire / Mares et biodiversité des milieux aquatiques et humides / M. Bunel ... ces atlas varient selon la méthode employée. ... Maintenir les prairies permanentes grâce à une fauche tardive et un .. simple déclaration si la superficie est comprise entre 100m² et 2 Ha. .. Chaque opérateur réalise un diagnostic.

Derrière les chiffres, ce sont des cartes d'identité et des diagnostics des territoires littoraux qui

se dessinent, ainsi . Fiche n°22 : préserver la biodiversité : les espèces ... simple monofil .. 90% de ces terrains sont des prairies permanentes,.

De la gestion des prairies à l'hybridation des savoirs. The Contribution of .. Biodiversité des prairies permanentes, une méthode simple de diagnostic. Dijon.

Au-delà des intérêts pour la biodiversité, qui vont être développés dans cette fiche, établir des plantes .. Le diagnostic initial réalisé par un spécialiste permet de mettre en évidence ces .. Association simple sédum/mousse/lichen. 5-10cm. Association de plantes de prairies sèches, plantes vivaces à port bas, résistant à la.

La méthode régionale de diagnostic pour évaluer la biodiversité .. Le niveau le plus simple à appréhender est celui des espèces et l'indicateur le plus utilisé ... labourés (prairies permanentes, pelouses, bosquets, haies, bandes enherbées,.

14 déc. 2015 . 2.2.2 - biodiversité et espaces reconnus et protégés . .. 4.5.2 - Le diagnostic du fonctionnement pluvial d'angers Loire métropole préambule - méthodologie retenue pour l'observation de l'occupation .. Les prairies permanentes ou temporaires sont exploitées pour le pâturage des.

concrètement pour préserver la biodiversité, tout en valorisant .. conseil ou simple incitateur. C'est là . une même démarche de diagnostic préalable, qui vise.

5 La préservation des milieux naturels, la biodiversité et les paysages .. Cet indicateur est simple à comprendre et à calculer, . de méthodes et démarches pour l'apprentissage et ... 2

Prairie de Triac . Concernant ces 3 captages, le diagnostic territorial des pressions agricoles .. enherbées permanentes en bordure de.

SRCE Auvergne – Méthodologie d'identification de la Trame Verte et Bleue régionale. 2/53 ...

...sont intégrés automatiquement aux réservoirs de biodiversité de la Trame .. Figure 1 : Ecopaysages et sous-trames de l'Auvergne (diagnostic des ... Le calcul de densité de prairie permanente est basé sur les informations du.

25 mai 2015 . biodiversité de la planète et que les services écosystémiques qu'il rend sont primordiaux. Il .. Loin d'être un simple support, il est donc ... (57% de la superficie totale), mais les pâtures et prairies permanentes dépassent les surfaces cultivées . mêmes méthodes d'estimation ni les mêmes définitions pour.

Liste des différentes espèces de graminées et de légumineuses prairiales régulièrement rencontrées dans lors des diagnostics de prairie.

28 juin 2007 . Réponse des graminées des prairies permanentes à l'acidité, .. diagnosis of the Al toxicity hazard in acid soils and of the reactivity of the media to liming. . Effet de l'acidité sur la biodiversité végétale. 29. 2.3. . MATERIEL ET METHODES .. 2002, Marriotta et al., 2004) : l'abandon pur et simple conduit à.

1) Localisation des parcelles engagées, diagnostic d'exploitation..... 10. 2) Contrôle de la mesure « prairies fleuries » : la méthode des 3 tiers 11. 3) Date et . 2) Une mesure « biodiversité » simple et accessible à tous ! ... surtout dans le cas des prairies permanentes. 5) Construction de la.

fouurrager et gestion des prairies : qui fait quoi, comment, pour quels éleveurs, avec quels .. récolte, voire de stockage et distribution, ce qui n'est pas le plus simple. . mise en avant par exemple dans le projet CASDAR Prairies permanentes, .. Séminaire de lancement du projet PraiCoS : « Renouveler les méthodes de.

des surfaces importantes en prairies permanentes. Les parcours, les landes et les .. Cette méthode a été conçue pour permettre un diagnostic de durabilité des.

Biodiversité des prairies permanentes. Une méthode simple de diagnostic, Educagri éditions, Dijon, 161 p. Pépy E.-A., Frioux S., 2009. L'animal sauvage entre.

22 juil. 2016 . prairies dans une commune de moyenne montagne d'Auvergne : évaluation .

systèmes d'élevage : proposition d'une méthode quantitative mise au point ... évaluer la diversité floristique d'une prairie permanente, Fourrages, n° 194, p. ... 2009, Un outil simple de diagnostic de la biodiversité des prairies.

10 sept. 2016 . 3 étapes pour un diagnostic pédagogique en 30 minutes .. de serre, stockage de carbone, maintien de la biodiversité. - résultats sur la . prairies permanentes et aux haies. Au-delà . l'atelier laitier (méthodologie Perfalim).

13 mars 2014 . perturbations des prairies pour répondre . Quelle méthodologie générale ? . Diagnostics de biodiversité de 6 exploitations : . grille simple d'analyse . Systèmes mésophiles permanents (prairies naturelles, PT + de 10 ans).

Biodiversité des prairies permanentes. une méthode simple de diagnostic. Description matérielle : 2 vol. (XX-141 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM).

Analyse de la contribution des mares à la biodiversité départementale et .. différentes démarches et méthodes nationales ou régionales en cours. . portant un diagnostic écologique sur l'état des mares du Languedoc-Roussillon ; .. la réalisation de la typologie des mares par l'analyse statistique simple des relevés.

d'un diagnostic et de cartes couvrant toute la région, d'objectifs et d'un plan d'actions . Cette première proposition du Parc se base sur une méthode simple d'iden- . d'éléments favorables aux déplacements de la biodiversité (lisières, haies, prairies permanentes, zones humides, boisements), et sur les connaissances de.

participant, des méthodes visant à quantifier la biodiversité ordinaire. L'objectif de ces .. spontanée ou semée, temporaire ou permanente dans l'inter- rang.

Cette grille nouvelle se veut donc volontairement simple et claire. . La méthode proposée a pour premier objectif de durabilité de permettre l'auto-éva-.

8 nov. 2013 . Et maintenant la compensations des pertes de biodiversité . 52% des prairies naturelles . Diagnostic, suivi et l'évaluation des tendances .. tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires . Reprise des concepts, méthodes élaborés par ... Aller au-delà d'un indicateur simple.

. plantes) au stade 4. 5 Prairies permanentes de demi-montagne, pâturage 1er cycle .. OBSALIM est une méthode originale de diagnostic . nutrition. Elle est à la fois simple, car fondée sur ... Plus grande biodiversité en fauche-pâturage que.

(Pratiques, Méthodes de raisonnement . Résultats du diagnostic agri-environnemental à l'échelle de l'exploitation .. pour le système : biodiversité, recyclage des éléments minéraux, abri pour les animaux, . Prairies permanentes peu fertilisées. 0% ... ➤Le bilan DIALECTE est un outil simple et rapide pour l'évaluation.

METHODOLOGIE D'UNE DEMARCHE DE DIAGNOSTIC. .. Cette publication détaille une méthode opérationnelle de diffusion de l'agroforesterie à l'échelle d'un . matière organique, biodiversité, cinétiques de minéralisation...) conduisent à ... annuelles diversifiées, de prairies et/ou de cultures permanentes complexes).

en dynamique et b) la dimension spatiale de la biodiversité. Les premiers . disation des méthodes de mesures qui sont multiples et fonction du type . breux travaux en ont signalé la valeur diagnostique. (description des .. prairies humides de la vallée [3]. Des relevés . L'étude de la végétation dans les carrés permanents.

repères pour le diagnostic et la conduite de ce type de prairies a été conduite entre 2008 et 2011. Ce sont au total . constitue aujourd'hui un outil, simple d'accès, utile dans des démarches de diagnostic agro- . Mots-clés : Prairies permanentes, typologie, biodiversité, valeur alimentaire, production .. Matériel et méthodes.

9 mai 2011 . Contribuer à la production de diagnostics et expertises naturalistes .. Biodiversité des prairies permanentes : Une méthode simple de.

d'un (auto)diagnostic de l'exploitation agricole et de son parcellaire. .. Prairies permanentes non fertilisées et surfaces en herbe depuis plus de 5 ans. ... des IAE, éviterait que, par simple négligence ou méconnaissance, ces .. En utilisant les équivalences de surface de biodiversité de la PHAE2, la méthode de calcul est.

25 oct. 2012 . Le diagnostic biodiversité d'exploitation agricole en .. BALAY, Cl. Biodiversité des prairies permanentes: une méthode simple de diagnostic.

Préambule. 7. Introduction : la prairie permanente, un élément multi-services. 8. Objectifs généraux du guide. 9. 1ère partie - Approche conceptuelle du guide. 1.

Effets des pratiques agricoles sur la biodiversité à l'échelle de la .. La méthode de travail a consisté à analyser la bibliographie en fonction des . vergers) d'une part, et les prairies permanentes d'autre part, qui sont .. remplacer le schéma simple, linéaire, de la chaîne alimentaire habituellement considérée en lutte.

biodiversité des Installations de Stockage de Déchets (ISD) non dangereux ou . Elle s'inscrit dans un processus d'homogénéisation et de reproductibilité des diagnostics . être simple à mettre en oeuvre N _ ' . Mare permanente, Prairies sèches . Méthodes. HABITATS PATRIMONIAUX. Protocole d'inventaire de l'IQE 100.

Annexe 2 : Etat des lieux des méthodes et diagnostics environnementaux en milieu agricole .. cultures annuelles et permanentes et les prairies) et par les infrastructures ... La richesse spécifique est l'indice le plus simple, il s'agit du nombre.

pour lui servir d'outil de diagnostic et de suivi . biodiversité. ... 3 unités de durabilité aux exploitations ayant des prairies permanentes ou de plus de 5 ans pâturées au fauchées ou 6 ... IDEA est un outil de diagnostic simple, fidèle, sen-.

Au-delà du simple effet d'une réduction du chargement, les relations entre . un effet favorable sur la biodiversité des prairies de moyenne montagne,

La sécheresse n'est pas un état naturel, mais le produit d'un stress. 2. De la biodiversité de la flore bactérienne de superficie dépend tout le fonctionnement du.

comme pour la biodiversité remarquable, la robustesse des méthodes .. se contenter d'une simple addition ou faut-il pratiquer des pondérations plus . étude similaire dans le cas des prairies permanentes pour lesquelles, lorsqu'elles sont .. des économistes, qui posent un diagnostic à partir de plusieurs indicateurs.

faunistique des prairies permanentes de la région. Son objectif . d'établir un diagnostic global de la biodiversité de parcelles de. prairies .. Méthode simple d'évaluation de la diversité floristique d'une prairie permanente. 09-Orth 25/06/08.

Diagnostic du site et enjeux . .. techniques et méthodes de gestion et en contribuant aux échanges de savoir faire dans ces différents .. Un pâturage équin est mis en place sur les prairies en bordure ouest du plan d'eau les ... plus simple est souvent de délimiter une zone de haut-fond et une ou des berges en. « réserve.

exemple, les haies, les bocages, les prairies naturelles et les zones humides. . la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. . entreprises – des outils, des méthodes et des techniques facilement .. dépasser la simple fonction d'embellissement pour entrer dans un renouveau du concept.

Les milieux humides, la biodiversité, ainsi que les processus naturels qui y sont ... parfois permanentes sur les tourbières, et sur les bassins versants dont elles font .. l'analyse d'un projet et aider l'analyste à poser un diagnostic quant à son . Au même titre que les massifs boisés, les prairies ouvertes, les cours d'eau ou.

3 mars 2017 . Coopérative de Boisseaux - Préserver la biodiversité patrimoniale et assurer la continuité ... Son objectif : maintenir le savoir-faire des méthodes culturelles et l'existence des .. Le principe est simple, il suffit de se déplacer entre mai .. et par l'importance des surfaces de

prairies permanentes dont la.

témoigne de la richesse de la biodiversité présente dans les PNR. Les surfaces d'aires . Les prairies y sont mieux représentées, les terres arables moins présentes. . née au nombre d'habitants permanents, nettement plus élevée. .. Élaborée à partir d'un diagnostic de territoire et selon un . Méthodologie générale.

Étangs, lagunes, estuaires, marais, prairies humides, mangroves, . de biodiversité et des espaces paysagers qui côtoient les quartiers, .. Les services techniques : transmettre une méthodologie .. pour mener des pré-diagnostic et diagnostics écologiques) . d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente.

récréative et à la préservation de la biodiversité littorale : diagnostic des pratiques, grandes marées de sensibilisation des ... 3.1.1 Méthodologie de la cartographie des habitats soumis à l'examen de l'Architecte des Bâtiments de France qui dispose d'un avis simple sauf pour les .. permanentes, prairies pâturées, etc.

Le présent document précise dans un premier temps la méthode utilisée . Le type d'action à mettre en place (surveillance, gestion simple, restauration, réhabilitation...) ... pas d'envisager des aménagements particuliers en faveur de la biodiversité. .. Réorientation de certaines cultures en prairies permanentes ou zones.

La densité des éléments paysagers (arbres et haies, prairies permanentes, . Par défaut d'une méthode de contrôle simple et efficace, le mildiou de la . Biodiversité fonctionnelle; Pollinisation; Meilleure maîtrise de la pression des ravageurs . Témoignage complet (PDF) · Diagnostic agroenvironnemental Dialecte (PDF).

14 juin 2007 . Stratégie Régionale pour la Biodiversité en Ile de France .. CHARGES DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE92 . pays bocagers, comprenant des prairies, des haies, des mares, des cultures et des bois. ... affichés et les méthodes proposées tant au niveau international.

Méthodes. Un diagnostic agro-environnemental spatialisé et évolutif, portant sur la problématique des . prairies permanentes ne sont pas prises en considéra-

30 juil. 2013 . ou artificielles , permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, . La méthodologie employée pour cette étude se basera . Au sein de son chapitre 8 intitulé "Préserver les zones humides et la biodiversité", le SDAGE ... Les prairies humides se développent sur les terrasses alluviales.

Diagnostic de prairie. Livret. Inter'Herbe. Grâce au financement de : . (ressemis), . Le choix de la méthode dépend de l'état de ... En particulier dans les prairies permanentes, on . feuille simple ou composée . diminution de la biodiversité.

elle est surtout beaucoup plus simple à poser qu'à . le carbone (C) par la méthode. Anne (la plus .. biodiversité des sols, le RMQS Biodiv, a permis d'étudier la ... mettre d'affiner le diagnostic. .. cultures annuelles en prairie permanente.

communal de la biodiversité est une démarche indispensable qui donne du ... de disposer d'un diagnostic des enjeux « biodiversité » à la fois stratégique et .. variés comme les prairies pâturées, les jachères, les bords de chemins, les ... Fonds de soutien aux ABC » dont le principe, simple, permet aux communes qui le.

tation, préserver la biodiversité locale ou animer votre jardin d'un lieu vivant en perpétuelle . Du diagnostic aux solutions. Leur création p.9 . place, des mares sont aménagées dans les prairies. Les plus récentes sont .. Mare permanente.

La biodiversité dans les syst`emes d'exploitation agricole : le projet IBIS. La prise . and cow breeders), which tested the method of farm diagnosis with the help of .. CEZ-Bergerie Nationale de Rambouillet, l'Assemblée permanente des Cham- .. Travaux de récolte (hors prairie) .. potentielle (IBP): une méthode simple et.

la biodiversité floristique des prairies de fauche . L'indicateur GALLYC a pour ambition d'être simple, rapide et utilisable par des techniciens généralistes. Il ressort que 46 . permanentes situées dans la vallée inondable de la Meuse, à partir de Verdun jusqu'à la .. d'un point zéro selon la méthode Gallyc par exemple. 8.

. Un autre regard sur les prairies permanentes à forte biodiversité de Haute-Saône . autour du diagnostic territorial (projet de convention agriculture et culture).

Une rencontre avec la faune des prairies (biodiversité sauvage et sau- vage fonctionnelle) . Voir aussi le dossier sur la biodiversité fonctionnelle de J.P. Sarthou, Alter Agri N°76 ... de la prairie permanente pâturée. . ries d'Auvergne et proposition de diagnostic. .. significatifs (dépassant le simple constat d'érosion) pour.

floristique des prairies ou les auxiliaires de culture et la productivité agricole, . Ce recueil se veut un outil de dialogue autour de la biodiversité entre .. Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture d'agriculture, le livret biodiversité de la FNSEA, ou des diagnostics .. Cette méthode est la première au niveau.

Observatoire des pratiques agricoles et des prairies permanentes de la Vallée d'Ercé (09) .. fait, cette méthode simple permettrait lors de négociations avec les éleveurs ... diagnostic de leurs dynamiques et l'étude des SE rendus à l'élevage.

Diversité des prairies permanentes en zone de montagne alpine. Diversité .. Volet n°2 :

Préserver la biodiversité et la production ... La méthode employée a été celle de De ... en effet un indicateur simple d'évaluation de . 10 Plantes de la liste « Prairies fleuries » (Concours national 2010) identifiées lors de diagnostics.

le calcul de certains indicateurs du diagnostic : bilan apparent, empreinte . Ce diagnostic emprunte des concepts à trois méthodes existantes que sont les ... S'il y a présence de prairies dans l'assolement, la comparaison se fait à la . critère : Biodiversité .. Otex 3900 - Fruits et cultures permanentes .. Semis simple. 6.

Une prairie permanente est un terrain herbeux peu ou pas travaillé qui sert au pâturage. Les prés communaux et les prairies permanentes anciennes sont aussi des prairies fleuries parfois très riches en biodiversité .. nationale des prairies permanentes » est aussi un outil utile pour les diagnostic agro-environnemental.

A partir des conclusions du diagnostic de l'exploitation, l'agriculteur peut envisager plusieurs hypothèses . ces différents enjeux, réduit les problèmes d'érosion, favorise la biodiversité, améliore le réseau . simple pour l'agriculteur d'améliorer le suivi de son exploitation. ...

Diversité des cultures et prairies permanentes.

INTERNATIONAL agriculture • alimentation • biodiversité • environnement ... Méthodes de diagnostic pour l'amélioration .. la couverture végétale permanente.

maintien de la biodiversité du territoire. Les activités agricoles, .. Annexe 2 : Méthodologie du diagnostic . . La zone agricole permanente de l'agglomération de Montréal couvre 2047 hectares (ha), ce qui ... Rivière des Prairies. Senneville.

PPEANP de Marne-et-Gondoire - Diagnostic complémentaire intégrant Jablines et Montévrain - 2012 .. V. Menaces et enjeux pour la biodiversité à l'échelle du territoire . . Il se base sur la méthodologie de l'analyse fonctionnelle des .. prairies permanentes) représentent 96% de la SAU déclarée par les agriculteurs.

jour sur le terrain pour préserver ou restaurer la biodiversité. . des bureaux d'études effectuant des diagnostics naturalistes, concevant des plans . Ces méthodes et techniques doivent être adaptées à la complexité et aux parti .. 2012-2013 : fauche tardive sur prairie à Moli- .. avec six permanents expérimentés et quali-

appel à CDC Biodiversité pour réaliser un diagnostic complet accompagné d'axes à suivre pour améliorer la .. Les massifs saisonniers devenaient permanents, mais ponctués cycliquement par

... Le principe de cet outil est simple, il s'agit tant d'une pioche que .. ou moins sommaire : forêts, prairies, plans d'eau, dunes...

de l'érosion des sols et de conservation de la biodiversité. Les zones humides, les . Par la proposition d'une méthode simple s'appuyant sur des données.

La méthode de diagnostic d'exploitation IBIS propose une démarche cadrée, des . Le diagnostic IBIS estime le potentiel de biodiversité à partir de l'étude des milieux ... Utiliser l'orthophoto est le plus simple car on y devine le contour des . ▷ Pour les prairies : distinguer prairies permanentes et prairies temporaires.

Restauration et gestion des prairies alluviales. Restauration .. simple surveillance, tandis qu'un petit site perturbé exigera . pour renforcer les fondements scientifiques des méthodes utilisées . depuis le diagnostic jusqu'à l'évaluation des actions mises en ... prairies permanentes à forte biodiversité est difficile, lente,.

pâturage itinérant sur l'organisation de la biodiversité et les flux biologiques .. Biodiversité des prairies permanentes : Une méthode simple de diagnostic (C.

16 oct. 1970 . salants et prés-salés, marais doux et saumâtres, prairies et étangs, ... Restauration et maintien de prairies permanentes. 6-4 .. écosystèmes, méthodes de limitation). .. Un plan simple de gestion y est établi lorsque la propriété boisée ... Le « Diagnostic du territoire et l'identification des enjeux » (titre 1).

Cette méthode nationale permet une évaluation rapide des fonctions des . le diagnostic fonctionnel permet d'apprécier l'intensité probable de chaque ... ou à la biodiversité, conformément aux objectifs assignés à la compensation . grande variété d'écosystèmes (par ex. prairies humides, forêts humides, écosystèmes.

l'élaboration d'un outil d'aide au diagnostic et à la conduite des prairies : la typologie des prairies de . part des prairies sont permanentes c'est-à-dire qu'elles ne sont . Méthode d'élaboration ... La biodiversité diminue très rapidement.

faveur de la biodiversité sur les territoires agricoles de . La méthode de diagnostic a été réalisée avec le soutien de : Pour plus de . Un outil simple d'utilisation pour : Notre travail . Présence d'élevage et de prairies permanentes, . • Quantité.

Liste non exhaustive de ressources sur la biodiversité dans les exploitations .. Biodiversité des prairies permanentes : une méthode simple de diagnostic, 110p.

